

CAMPAÑA LATINOAMERICANA DE PREVENCIÓN DE LA AMBLIOPÍA 2019 "DR. ALBERTO CIANCIA"



GUÍA PARA LOS PADRES

¿QUÉ ES LA AMBLIOPÍA? // (Ojo vago)

La ambliopía es la mala visión en uno o ambos ojos debido a una falla en el desarrollo visual en los primeros años de vida. Puede ser irreversible sino es tratada en forma oportuna.

¿ES COMÚN LA AMBLIOPÍA?

La ambliopía es la causa más común de discapacidad visual en la niñez. La padecen 2 a 3 de cada 100 niños.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE AMBLIOPÍA?

Los vicios de refracción (OJOS DESENFOCADOS miopía, hipermetropía, astigmatismo), estrabismo (OJOS TORCIDOS), opacidades de los medios transparentes del ojo (catarata congénita, opacidades de la córnea). Lesiones de los párpados: tumores, caídas del párpado (Ptosis), etc.-

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

Suele pasar inadvertida. Los niños que la padecen no presentan ningún síntoma. Es necesaria una evaluación oftalmológica periódica, durante los primeros años de vida, para diagnosticarla.

¿A QUIÉN PUEDE AFECTAR?

Todos los niños pueden ser afectados. El riesgo aumenta en los prematuros, en las enfermedades genéticas y si hay antecedentes familiares de afecciones oculares.

¿CUÁNDO Y CÓMO SE TRATA LA AMBLIOPÍA?

El tratamiento debe comenzar lo antes posible. Es más efectivo cuando se hace antes de los 7 años de edad. Se basa en la corrección de la patología que impide el desarrollo visual

ORGANIZA: INFORMES:



CLADE
CONSEJO LATINOAMERICANO DE ESTRABISMO
CONSELHO LATINOAMERICANO DE ESTRABISMO

mw MAQUIMENA
CONGRESOS & EVENTOS

381 666 3649 / info@maquimena.com.ar

CAMPAÑA LATINOAMERICANA DE PREVENCIÓN DE LA AMBLIOPÍA 2019 "DR. ALBERTO CIANCIA"



del ojo comprometido por medio de anteojos o cirugía, asociado a la oclusión del ojo sano para potenciar su estimulación.

RECUERDE:

- LA AMBLIOPÍA ES LA PRINCIPAL CAUSA DE DISMINUCIÓN VISUAL EN NIÑOS.
- NINGÚN NIÑO DEBERÍA CRECER CON AMBLIOPÍA
- PUEDE PRODUCIR DISCAPACIDAD VISUAL PERMANENTE SI NO SE TRATA A TIEMPO.
- NO PRODUCE SÍNTOMAS.
- LOS HIJOS DE PADRES CON PROBLEMAS VISUALES SON LOS PACIENTES CON MAYOR RIESGO.
- PUEDE PREVENIRSE POR MEDIO DE CONTROLES OFTALMOLÓGICOS PERIÓDICOS EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA.
- EL TRATAMIENTO ES MÁS EFECTIVO SI SE APLICA EN EDAD PREESCOLAR.
- EL TRATAMIENTO OCLUSIVO CON PARCHES OCULARES ES EL DE MAYOR EFICACIA JUNTO AL TRATAMIENTO DE LA CAUSA DESENCADENANTE.
- LA AMBLIOPÍA QUE HAYA SIDO TRATADA Y MEJORADA TIENE RIESGOS DE RECAÍDAS, POR ELLO ES IMPORTANTE EL CONTROL PERIÓDICO.

ORGANIZA: INFORMES:



CLADE
CONSEJO LATINOAMERICANO DE ESTRABISMO
CONSELHO LATINOAMERICANO DE ESTRABISMO

mw MAQUIMENA
CONGRESOS & EVENTOS

381 666 3649 / info@maquimena.com.ar